

Quand faut-il suspecter une déficience auditive ?

Votre **enfant** peut être atteint d'une déficience auditive dans les cas suivants :

- il ne répond pas aux sons
- il ne comprend pas bien ce que vous lui dites
- il a un retard du développement de l'élocution ou celle-ci est incorrecte
- il présente un écoulement provenant de l'oreille
- il souffre d'épisodes de douleurs à l'oreille ou d'une obstruction au niveau de l'oreille.



En tant **qu'adulte**, vous pourriez être atteint de déficience auditive si :

- vous demandez souvent aux gens de répéter ce qu'ils disent
- vous avez tendance à augmenter le volume de la radio ou de la télévision
- vous manquez régulièrement des parties de conversations
- vous sentez un bourdonnement dans les oreilles [acouphènes]
- les gens vous disent que vous parlez fort.



Plus de 466 millions de personnes souffrent de déficience auditive incapacitante. Selon les prévisions, **d'ici à 2050, près d'une personne sur 10 sera atteinte de déficience auditive.**

Il est possible de prévenir de nombreuses causes de déficience auditive. En cas de déficience auditive, l'identification précoce et la prise en charge adaptée permettent de réduire les effets néfastes.

WHO/NMH/NVI/18.7

© OMS 2018. Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant :
www.who.int/deafness/world-hearing-day/whd-2018/en



Organisation mondiale de la Santé
whopbd@who.int



DÉFICIENCE AUDITIVE :

Comment prévenir la déficience auditive et réduire son impact ?



...préparons
-nous



Qu'est-ce que la perte d'audition ?

On parle de perte d'audition lorsqu'une personne n'est pas capable d'entendre aussi bien qu'une personne ayant une audition normale. La gravité est variable. Une personne souffrant d'une **perte d'audition légère** peut avoir des difficultés pour comprendre des conversations dans des lieux bruyants comme les restaurants. Une personne atteinte d'une **perte d'audition moyenne** a des difficultés à comprendre des conversations normales à moins que les personnes n'élèvent leur voix. Les personnes souffrant de **perte d'audition sévère** ne sont pas capables d'entendre, y compris les sons très forts près de leurs oreilles.

Quelles sont les causes de la déficience auditive ?

1

Chez le nouveau-né :

- des antécédents familiaux
- une infection chez la mère pendant la grossesse
- une naissance prématurée
- la privation d'oxygène à la naissance
- une jaunisse grave juste après la naissance.

2

Chez l'enfant et l'adulte :

- des infections comme la méningite, la rougeole, les oreillons ou les infections de l'oreille assorties d'un écoulement
- l'utilisation de certains médicaments
- un traumatisme crânien ou une blessure de l'oreille
- l'exposition à des niveaux sonores élevés dans différents lieux
- l'utilisation d'appareils audio personnels à des niveaux sonores dangereux
- un bouchon de cérumen ou un corps étranger bloquant le canal auditif.

3

Chez les personnes âgées :

- une étape normale du vieillissement
- l'exposition à des niveaux sonores élevés dans différents lieux
- l'hypertension artérielle
- le diabète
- l'utilisation de certains médicaments.



Que pouvez-vous faire pour éviter une perte auditive ?



En tant qu'individu :

- n'introduisez aucun objet dans vos oreilles
- utilisez des écouteurs ou des casques antibruit dans les endroits bruyants
- en cas de problème aux oreilles, consultez immédiatement un médecin
- vérifiez si les médicaments que vous prenez peuvent avoir une incidence sur votre audition
- effectuez régulièrement des tests de l'audition
- si un appareil auditif vous est conseillé, utilisez-le selon les indications

En tant que personne chargée des soins aux enfants :

- n'introduisez en aucun cas d'objets dans les oreilles de l'enfant, y compris pour les nettoyer
- enseignez aux enfants à ne jamais rien introduire dans leurs oreilles
- si l'enfant se plaint de douleurs, d'oreilles bouchées ou d'écoulement, amenez-le chez un médecin
- interdisez aux enfants de nager dans des eaux usées
- ne frappez pas ou ne giflez pas l'enfant
- protégez les oreilles des enfants contre les niveaux sonores élevés
- apprenez aux enfants à utiliser de manière sûre les appareils audio personnels.

En tant qu'agent de santé communautaire :

- renseignez-vous sur la perte auditive et partagez les informations concernant les soins auditifs et des oreilles
- vous devez savoir où les services de soins auditifs sont fournis et orienter les personnes sur la façon d'y accéder
- adressez les personnes à un médecin en cas de douleurs aux oreilles ou d'écoulement
- renseignez-vous sur les appareils auditifs et aidez les personnes à les utiliser correctement
- encouragez les personnes sourdes à utiliser la langue des signes et organisez des groupes de soutien.

En tant qu'enseignant :

- si un enfant est dissipé en classe, cela pourrait indiquer une déficience auditive ; envisagez de proposer un test auditif
- mieux faire connaître aux enfants les soins de l'oreille et les risques qu'il peut y avoir à insérer des objets dans les oreilles et d'écouter des sons forts, y compris la musique
- respectez les enfants : le fait de frapper un enfant ou de le gifler pourrait entraîner une perte auditive
- en cas d'écoulement ou de douleurs aux oreilles, adressez immédiatement l'enfant à un médecin.