

Quand faut-il suspecter une déficience auditive?

Votre **enfant** peut être atteint d'une déficience auditive dans les cas suivants :

- Il ne répond pas aux sons.
- Il ne comprend pas bien ce que vous lui dites.
- Il a un retard du développement de l'élocution ou celle-ci est incorrecte.
- Il présente un écoulement provenant de l'oreille.
- Il souffre d'épisodes de douleurs à l'oreille ou d'une obstruction au niveau de l'oreille.




En tant **qu'adulte**, vous pourriez être atteint de déficience auditive si :

- Vous demandez souvent aux gens de répéter ce qu'ils disent.
- Vous avez tendance à augmenter le volume de la radio ou de la télévision.
- Vous manquez régulièrement des parties de conversations.
- Vous sentez un bourdonnement dans les oreilles [acouphènes].
- Les gens vous disent que vous parlez fort.



DÉFICIENCE AUDITIVE : Comment prévenir la déficience auditive et réduire son impact?



Quelque chose pourrait vous échapper ?

Vérifiez votre audition



Application pour vérifier votre audition



Journée Mondiale de l'audition 2019



WHO/NMH/NVI/18.7

© OMS 2019. Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant : <https://www.who.int/deafness/world-hearing-day/2019/en/>



Organisation mondiale de la Santé

Organisation mondiale de la Santé
whopbd@who.int



Qu'est-ce que la perte d'audition?

On parle de perte d'audition lorsqu'une personne n'est pas capable d'entendre aussi bien qu'une personne ayant une audition normale. La gravité est variable. Une personne souffrant d'une **perte d'audition légère** peut avoir des difficultés pour comprendre des conversations dans des lieux bruyants comme les restaurants. Une personne atteinte d'une **perte d'audition moyenne** a des difficultés à comprendre des conversations normales à moins que les personnes n'élèvent leur voix. Les personnes souffrant de **perte d'audition sévère** ne sont pas capables d'entendre, y compris les sons très forts près de leurs oreilles.

Quelles sont les causes de la déficience auditive ?

1

Chez le nouveau-né:

- Des antécédents familiaux
- Une infection chez la mère pendant la grossesse
- Une naissance prématurée
- La privation d'oxygène à la naissance
- Une jaunisse grave juste après la naissance.

2

Chez l'enfant et l'adulte :

- Des infections comme la méningite, la rougeole, les oreillons ou les infections de l'oreille assorties d'un écoulement.
- L'utilisation de certains médicaments.
- Un traumatisme crânien ou une blessure de l'oreille.
- L'exposition à des niveaux sonores élevés dans différents lieux.
- L'utilisation d'appareils audio personnels à des niveaux sonores dangereux.
- Un bouchon de cérumen ou un corps étranger bloquant le canal auditif.

3

Chez les personnes âgées :

- Une étape normale du vieillissement
- L'exposition à des niveaux sonores élevés dans différents lieux
- L'hypertension artérielle
- Le diabète
- L'utilisation de certains médicaments.



Que pouvez-vous faire pour éviter une perte auditive ?



En tant qu'individu:

- N'introduisez aucun objet dans vos oreilles.
- Utilisez des écouteurs ou des casques antibruit dans les endroits bruyants.
- En cas de problème aux oreilles, consultez immédiatement un médecin.
- Vérifiez si les médicaments que vous prenez peuvent avoir une incidence sur votre audition.
- effectuez régulièrement des tests de l'audition
- si un appareil auditif vous est conseillé, utilisez-le selon les indications.



En tant que personne chargée des soins aux enfants:

- N'introduisez en aucun cas d'objets dans les oreilles de l'enfant, y compris pour les nettoyer.
- Enseignez aux enfants à ne jamais rien introduire dans leurs oreilles.
- Si l'enfant se plaint de douleurs, d'oreilles bouchées ou d'écoulement, amenez-le chez un médecin.
- Interdisez aux enfants de nager dans des eaux usées.
- Ne frappez pas ou ne giflez pas l'enfant.
- Protégez les oreilles des enfants contre les niveaux sonores élevés.
- Apprenez aux enfants à utiliser de manière sûre les appareils audio personnels.



En tant qu'agent de santé communautaire:

- Renseignez-vous sur la perte auditive et partagez les informations concernant les soins auditifs et des oreilles.
- Vous devez savoir où les services de soins auditifs sont fournis et orienter les personnes sur la façon d'y accéder.
- Adressez les personnes à un médecin en cas de douleurs aux oreilles ou d'écoulement.
- Renseignez-vous sur les appareils auditifs et aidez les personnes à les utiliser correctement.
- Encouragez les personnes sourdes à utiliser la langue des signes et organisez des groupes de soutien.



En tant qu'enseignant:

- Si un enfant est dissipé en classe, cela pourrait indiquer une déficience auditive ; envisagez de proposer un test auditif.
- Mieux faire connaître aux enfants les soins de l'oreille et les risques qu'il peut y avoir à insérer des objets dans les oreilles et d'écouter des sons forts, y compris la musique.
- Respectez les enfants : le fait de frapper un enfant ou de le gifler pourrait entraîner une perte auditive.
- En cas d'écoulement ou de douleurs aux oreilles, adressez immédiatement l'enfant à un médecin.